


Core sets Klinimetrie bij CVA



De **core set revalidatie behandelfase** zal in een vervolgtraject worden uitgewerkt. Nadere analyse naar kernprofielen en kerninstrumenten voor deze fase is gewenst.

Gezien de diversiteit van de mogelijke problematiek lijkt een geschikte aanpak voor deze fase om patiënten profielen te maken op basis van problemen in de domeinen:

1. zelfredzaamheid en ambulantie
2. cognitief functioneren
3. communicatief functioneren
4. gedragsmatig functioneren
5. reïntegratie (HDL, vrije tijdsbesteding/arbeid)

Opmerking: voor een beoordeling van de scores van de items in de diverse domeinen dienen we ons te realiseren, dat problemen in het éne domein problemen in andere domeinen kunnen veroorzaken. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen in zelfredzaamheid berusten op beperkingen in fysiek functioneren (m.b.t. handfunctie, transfer/loopfunctie), beperkingen in cognitief functioneren (b.v. apraxie), of beperkingen in psychisch functioneren (b.v. depressie).

Hieronder staan de **core sets klinimetrie bij CVA**:

Core set Ziekenhuis fase

DOMEINEN EN ITEMS	
Premorbide situatie	
ADL en ambulantie : Barthel Index	P
Cognitie: Hetero Anamnese lijst Cognitie	P
Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale	P
Ziekte/biologie	
Leeftijd	PB
Bloedig/onbloedig	DB
Linker/rechter hemisfeer + zijde dominantie motoriek hand	D
Recidief CVA	P
Lokalisatie CVA: CT/MRI scan	DP
Functies/structuren	
Bewustzijnsverlies (< 48 uur post-CVA): Glasgow Coma Scale	PB
Slikstoornis: Standardised swallowing assessment	SB
Rompbalans: Trunk Control Test/ Trunk Impairment Scale	PB
Parese: Motricity Index subsecties arm en been	PB
Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale	SPB
Cognitie: Mini Mental Status Examination	SPB
Activiteiten	
Loopvaardigheid: Functional Ambulation Categories	PB
ADL en ambulantie : Barthel Index	PB
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	PB
Thuisituatie	
Woning aangepast	PB
Draagkracht partner: COOP-WONCA schalen	SPB
Bereidheid en beschikbaarheid partner	SPB
Sociaal netwerk : Sociale Netwerk Score	SPB

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren van de behandeling (doelen bepalen, monitoren en evalueren lopen in elkaar over: als je een behandeling hebt gemonitord of geëvalueerd, dan bepaal je daarna weer vervolgdelen)

Core set Start Klinische Revalidatie

DOMEINEN EN ITEMS	
Premorbide situatie	
Instrumentele ADL: Modified Frenchay Activities Index	D
Functies/structuren	
Woordvindingsstoornissen: Boston Benoemings Test \$	DB
Verbaal begrip: Token Test (indien afwijkend: Akense Afasie Test \$: niet < 2 weken post-CVA afnemen, tenzij bij lichte afasie)	DPB
Rechtshemisferische communicatiestoornissen: Rechtshemisferisch communicatie onderzoek \$	D
Rompbalans: Trunk Control Test/ Trunk Impairment Scale; Berg Balance Scale (indien FAC = 3) \$	DPB
Selectiviteit in motoriek hand, arm en been: Motorisch stadium Brunnstrom Fugl-Meyer Scale	DPB
Tonus arm en been: Ashworth Scale	D
Parese arm en been: Motricity Index	DPB
Positiezin hand: Thumb finding test	D
Bewegings- en positiezin enkel: Modified Nottingham Sensory Test	D
Cognitie: Screenend NPO conform NIP revalidatiepsychologie	SDPB
Activiteiten	
Armfunctie: Frenchay Arm Test, of Action Research Arm Test (bij plafondeffect: Nine Hole Peg Test \$)	SDB
Loopvaardigheid: Functional Ambulation Categories + 10 meter looptest + 6 minuten looptest	DB
ADL en ambulantie : Barthel Index ; A-one \$	DPB;SDB
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	DPB
Verbaal communicatieve vaardigheid: Amsterdam Nijmegen Taal Test	DB
Behoeften Inventarisatie en Probleem-Analyse van Communicatieve Activiteiten \$	DB
Cognitie: WCN observatielijst cognitieve beperkingen; AMPS \$	SB;SPB
Hulpvraag Revalidant	
Hulpvraag revalidant: Canadian Occupational and Performance Measure	DB

\$ Op indicatie: item alleen afnemen, indien het zinvol is om de schaal af te nemen.

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren behandeling

Opmerkingen: Bij de klinimetrie "start klinische revalidatie" gaan we ervan uit, dat we de beschikking hebben over de core sets klinimetrie van de ziekenhuisfase. Bij ontbreken van items uit de ziekenhuisfase dienen deze alsnog te worden afgenomen. De klinimetrie start klinische revalidatie wordt afgenomen binnen de eerste 2 à 3 weken na opname in het revalidatiecentrum.

Core set Start Poliklinische Revalidatie

DOMEINEN EN ITEMS	
Premorbide situatie	
Instrumentele ADL: modified Frenchay Activities Index	B
Functies/structuren	
Vermoeidheid: Fatigue Severity Scale	S
Woordvindingsstoornissen: Boston Benoemings Test \$	DB
Verbaal begrip: Token Test (indien afwijkend: Akense Afasie Test: \$: niet < 2 weken post-CVA afnemen, tenzij bij lichte afasie)	DBP
Rechtshemisferische communicatiestoornissen: Rechtshemisferisch communicatie onderzoek \$	D
Rompbalans: Trunk Control Test/ Trunk Impairment Scale; Berg Balance Scale (indien FAC = 3) \$	DBP
Selectiviteit in motoriek hand, arm en been: Motorisch stadium Brunnstrom Fugl-Meyer Scale	DBP
Tonus: Ashworth Scale	D
Parese arm en been: Motricity Index	DBP
Positiezin hand: Thumb finding test	D
Bewegings- en positiezin enkel: Modified Nottingham Sensory Test	D
Cognitie: Screenend NPO conform NIP revalidatiepsychologie \$	SDPB
Activiteiten	
Armfunctie: Frenchay Arm Test, of Action Research Arm Test (bij plafondeffect: Nine Hole Peg Test \$)	DSB
Loopvaardigheid: Functional Ambulation Categories + 10 meter looptest + 6 minuten looptest	D B
Transfers en ambulantie: Rivermead Mobility Index	DB
ADL en ambulantie : Barthel Index	DPB
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	DB
Verbaal communicatieve vaardigheid: Amsterdam Nijmegen Taal Test \$	DB
Behoeften Inventarisatie en Probleem-Analyse van Communicatieve Activiteiten \$	DB
Motorische en procesmatige vaardigheden: Assessment of Motor and Process Skills \$	SBP
Thuisituatie	
Ervaren belasting door zorgverlener: Caregiver Strain Index	S
Hulpvraag Revalidant	
Hulpvraag revalidant: Canadian Occupational and Performance Measure	DB

\$ Op indicatie: item alleen afnemen, indien het zinvol is om de schaal af te nemen.

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren behandeling

Opmerkingen: Bij de klinimetrie "start poliklinische revalidatie" gaan we ervan uit, dat we de beschikking hebben over de klinimetrie van de ziekenhuisfase, dan wel over de klinimetrie van de klinische revalidatiefase.

Screenend NPO conform NIP revalidatiepsychologie alleen afnemen, indien dit in een eerdere fase nog niet is verricht.

Core set Uitkomstmaten na Klinische Revalidatie

DOMEINEN EN ITEMS	
Functies/structuren	
Rompbalans: Trunk Control Test/ Trunk Impairment Scale; Berg Balance Scale (indien FAC = 3) \$	B;P
Selectiviteit in motoriek hand, arm en been: Motorisch stadium Brunnstrom Fugl-Meyer Scale	BP
Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale	BS
Cognitie: Mini Mental Status Examination	B
Activiteiten	
Armfunctie: Frenchay Arm Test; Action Research Arm Test (bij plafondeffect: Nine Hole Peg Test \$)	B
Loopvaardigheid: Functional Ambulation Categories + 10 meter looptest + 6 minuten looptest	B
ADL en ambulantie : Barthel Index	B
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	B
Transfers en ambulantie: Rivermead Mobility Index	B
Thuisituatie	
Ervaren belasting door zorgverlener: Caregiver Strain Index	S

\$ Op indicatie: item alleen afnemen , indien het zinvol is om de schaal af te nemen.

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren behandeling

Core set Uitkomstmaten na Poliklinische Revalidatie

DOMEINEN EN ITEMS	
Functies/structuren	
Rompbalans: Trunk Control Test/ Trunk Impairment Scale; Berg Balance Scale (indien FAC = 3) \$	BP
Selectiviteit in motoriek hand, arm en been: Motorisch stadium Brunnstrom Fugl-Meyer Scale	BP
Vermoeidheid: Fatigue Severity Scale	DB
Cognitie: Mini Mental Status Examination	B
Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale	DB
Activiteiten	
Armfunctie: Frenchay Arm Test, of Action Research Arm Test (bij plafondeffect: Nine Hole Peg Test \$)	B
Loopvaardigheid: Functional Ambulation Categories + 10 meter looptest + 6 minuten looptest	B
ADL en ambulantie : Barthel Index	P
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	B
Transfers en ambulantie: Rivermead Mobility Index	B
Instrumentele ADL: modified Frenchay Activities Index	B
Participatie	
Tevredenheid met leefsituatie: Life Satisfaction Questionnaire 9	DB
Thuisituatie	
Ervaren belasting door zorgverlener: Caregiver Strain Index	S

\$ Op indicatie

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren behandeling

Core set Nazorg

DOMEINEN EN ITEMS	
Functies/structuren	
Vermoeidheid: Fatigue Severity Scale	SB
Tonus: Ashworth Scale	SB
Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale \$	SB
Activiteiten niveau	
ADL en ambulantie : Barthel Index \$	SB
Loopvaardigheid: 10 meter looptest \$	SB
Transfers en ambulantie: Rivermead Mobility Index	SB
Instrumentele ADL: modified Frenchay Activities Index	
Communicatieniveau: Stichting Afasie Nederland schaal	SB
Participatie niveau	
Tevredenheid met leefsituatie: Life Satisfaction Questionnaire 9	DB
Thuisituatie	
Sociaal netwerk : Sociale Netwerk Score	S
Ervaren belasting door zorgverlener: Caregiver Strain Index	S

\$ Op indicatie

D: Diagnostiek

P: Prognostiek

S: Screening

B: Behandeldoelen bepalen, monitoren en evalueren behandeling